


১২ বছরের উর্ধ্ব ডাউন সিন্ড্রোমযুক্ত ব্যক্তিদের কোভিড-১৯ টিকাকরণ: ট্রাইসোমি ২১ রিসার্চ সোসাইটির একটি সমীক্ষা




মূল বার্তা	১২ বছরের উর্ধ্ব ১৮৯৫ জন অংশগ্রহণকারী	সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী
সাধারণ জনগোষ্ঠীর মতই ১৭০৮ জন টিকাপ্রাপ্ত ডাউন সিন্ড্রোম যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সংঘটিত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে কোভিড ১৯-এর টিকা নেওয়া নিরাপদ এবং ডাউন সিন্ড্রোম যুক্ত ব্যক্তিদের জন্যে খুবই কার্যকর: - টিকা নেওয়ার পর বেশিরভাগের মধ্যে খুব হাল্কা প্রতিক্রিয়া হয়েছে বা কোনো প্রতিক্রিয়াই হয়নি - টিকাপ্রাপ্ত ডাউন সিন্ড্রোম যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১% মানুষ টিকা পাওয়ার পর কোভিড ১৯ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন - টিকাপ্রাপ্ত ডাউন সিন্ড্রোম যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা টিকা পাওয়ার পর কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলেন, সকলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন	১৭০৮ (৯০.১%) জন অন্তত ১টি ডোজ নিয়েছেন ১৪৮২ (৮৬.৭%) জন দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন ১৮৭ (৯.৮%) জন টিকা নেননি ৩৬ (২০%) জন টিকা পাননি ১৫ (৯%) জন স্বাস্থ্যজনিত কারণের জন্যে নেননি ১২৯ (৭০%) অন্যান্য কারণে	টিকা প্রস্তুতকারী সংস্থা - ফাইজার-বায়োএনটেক ৫৮.১% - মডার্না ১৯.১% - অক্সফোর্ড-অ্যান্ড্রাজেনেকা / কোভিশিল্ড ১৯.৫% - জনসন অ্যান্ড জনসন ১.৩% - অন্যান্য ২%




বয়সভিত্তিক ফলাফল

১২ – ১৭ বছর বয়সের মধ্যে (৩২৯ জন)	১৮ বছর বয়সের উর্ধ্ব (১৩৭৯ জন)
-----------------------------------	--------------------------------

ডাউন সিন্ড্রোম বিহীন এবং ডাউন সিন্ড্রোম যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনুরূপ যেসকল প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে



খুব কম সংখ্যক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছে



টিকাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ০.৮% মানুষ টিকাকরণের পর কোভিড ১৯ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন

ঐদের মধ্যে ০.৩% মানুষের বয়স ১২ থেকে ১৭র মধ্যে	ঐদের মধ্যে ০.৩% মানুষের বয়স ১৮র বেশী				
<u>দ্বিতীয় ডোজের পর ১জন আক্রান্ত</u> - দ্বিতীয় ডোজের পর ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর আক্রান্ত হয়েছেন - হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়নি - রোগের লক্ষণ ১০ দিন অবধি ছিল - সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন	<table><tr><th>প্রথম ডোজের পর ৮জন আক্রান্ত</th><th>দ্বিতীয় ডোজের পর ৫জন আক্রান্ত</th></tr><tr><td> ২জন কে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে - সকলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন </td><td> - সকলেই দ্বিতীয় ডোজের পর ৬০ দিন পর আক্রান্ত হয়েছেন - কাউকেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়নি - সকলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন </td></tr></table>	প্রথম ডোজের পর ৮জন আক্রান্ত	দ্বিতীয় ডোজের পর ৫জন আক্রান্ত	২জন কে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে - সকলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন	- সকলেই দ্বিতীয় ডোজের পর ৬০ দিন পর আক্রান্ত হয়েছেন - কাউকেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়নি - সকলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন
প্রথম ডোজের পর ৮জন আক্রান্ত	দ্বিতীয় ডোজের পর ৫জন আক্রান্ত				
২জন কে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে - সকলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন	- সকলেই দ্বিতীয় ডোজের পর ৬০ দিন পর আক্রান্ত হয়েছেন - কাউকেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়নি - সকলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন				

সীমাবদ্ধতা

- সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও পরিবেশ পেয়েছেন; অতএব এই সমীক্ষার ফল সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়
- বেশীরভাগ অংশগ্রহণকারীই প্রাপ্তবয়স্ক (৮১%)
- দ্বিতীয় ডোজ প্রাপ্তি এবং সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করার মধ্যে গড় ১১২ দিনের ব্যবধান ছিল; অতএব এর দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষার ব্যাপারে এই সমীক্ষার ফল প্রযোজ্য নয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

The Trisomy 21 Research Society (T21RS) COVID-19 Taskforce developed the survey, with the financial and dissemination support of Down Syndrome Affiliates in Action (DSAIA), Down Syndrome Medical Interest Group-USA (DSMIG-USA), GiGi's Playhouse, Jerome Lejeune Foundation, LuMind IDSC Foundation, The Matthew Foundation, National Down Syndrome Society (NDSS), and the National Task Group on Intellectual Disabilities and Dementia Practices (NTG). These and other international Down syndrome organizations are members of the T21RS COVID-19 stakeholders advisory group that provided advice to inform the design of the survey questions and interpretation of results, including the Global Down Syndrome Foundation (USA), DSA (UK), DSMIG (UK), DSMIG (USA), DSRF-UK, DSI, DSE international, Trisomie21-France, Down España, National Down Syndrome Congress (NDSC), Down Madrid, Fundació Catalana Síndrome de Down (Spain), EDSA, Royal College of Psychiatrists, CoordDown (Italy), Associazione Italiana Persone Down (AIPD; Italy), AFRT (France), Fundación Iberoamericana Down 21 (Spain), FIADOWN (Latin America), Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (Brazil) and the European Down Syndrome Association. We acknowledge the contribution of DS-Connect® (The Down Syndrome Registry) which is supported by the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), NIH for the dissemination of the T21RS survey. We also wish to thank the many families and clinicians who contributed to the survey.